

Importante

Infórmele a su proveedor de servicio de salud si presenta algún efecto secundario (náuseas, vómitos, diarrea, erupciones en la piel) o si cree que pudo haber adquirido alguna infección de transmisión sexual (ITS).

DoxyPEP reduce el riesgo de sífilis, gonorrea y clamidia, pero estas infecciones aún pueden ocurrir. Debe realizarse las pruebas de ITS de manera rutinaria al igual que la de VIH.

DoxyPEP no previene el Mpox (viruela símica), el VIH u otras infecciones virales.

Continúe usando condones

El uso correcto y constante del condón reduce la transmisión de ITS y el VIH. Recuerde utilizar un condón nuevo para cada acto sexual (oral, vaginal y anal).



Accede al formato digital de este y otros recursos descargables.

Ponce / 787-284-5884
Arecibo / 787-680-0236


San Juan / 787-296-8888

centroararat   

PROTEGE LO
QUE AMAS

centroararat.org

RECORDATORIO: Esta publicación es solo para fines informativos.
No tiene consejo médico, diagnóstico o tratamiento.



**CENTRO
ARARAT**
protege lo que amas

DoxyPEP

¿Qué es **DoxyPEP**?

El tratamiento de Profilaxis Post Exposición para prevenir la infección por bacterias que causan la **sífilis, la gonorrea y la clamidia**, consiste en tomar el antibiótico doxiciclina (DoxyPEP) después de tener relaciones sexuales sin condón.

DoxyPEP ha demostrado ser eficaz cuando lo toman **hombres cisgéneros y mujeres transgénero que tienen relaciones sexuales sin el uso del condón anales, vaginales y orales**.

La doxiciclina es un medicamento de la familia de la tetraciclina que se usa como tratamiento para infecciones bacterianas. No debe tomar doxiciclina si es alérgico a algún antibiótico de tetraciclina.



¿Cuándo debe tomar **DoxyPEP**?

Se recomienda tomar dos pastillas de 100 mg de doxiciclina dentro de las 24 horas (y no más tarde de 72 horas) después de tener relaciones sexuales orales, anales o vaginales sin condón.

¿Qué pasa cuando vuelve a tener **relaciones sexuales sin condón**?

Si practica sexo sin condón dentro de las 24 horas luego de haber tomado doxiciclina, puede volver a tomar otra dosis cuando pasen 24 horas después de su última dosis. No tome más de 200 mg (dos píldoras de 100 mg) en un día.



¿Cómo debe tomar la **DoxyPEP**?



- Tome doxiciclina con mucha agua. Tómela con comida, si siente que le cae mal a su estómago.



- Use protector solar, ya que la sensibilidad de su piel al sol puede aumentar cuando usa antibióticos.



- Evite productos lácteos, calcio, antiácidos o los multivitamínicos mientras use el medicamento.



- Debe tomar su dosis completa; no comparta el medicamento con otras personas.