

Importante

Infórmele a su proveedor de servicio de salud si presenta algún efecto secundario (náuseas, vómitos, diarrea, erupciones en la piel) o si cree que pudo haber adquirido alguna infección de transmisión sexual (ITS).

DoxyPEP reduce el riesgo de sífilis, gonorrea y clamidia, pero estas infecciones aún pueden ocurrir. Debe realizarse las pruebas de ITS de manera rutinarias al igual que la de VIH.

DoxyPEP no previene el Mpox (viruela símica), el VIH u otras infecciones virales.

Continúe usando condones

El uso correcto y constante del condón reduce la transmisión de ITS y el VIH. Recuerde utilizar un condón nuevo para cada acto sexual (oral, vaginal y anal).



Accede al formato digital de este y otros recursos educativos descargables.

Ponce:
787-284-5884

San Juan:
787-296-8888


Arecibo:
787-680-0236

@centroararat



centroararat.org

RECORDATORIO: Esta publicación es solo para fines informativos.
No tiene consejo médico, diagnóstico o tratamiento.



**CENTRO
ARARAT**
aquí por tu salud

DoxyPEP

¿Qué es DoxyPEP?

El tratamiento de Profilaxis Post Exposición consiste en tomar el antibiótico Doxiciclina **después de tener relaciones sexuales orales, vaginales o anales sin condón.**

DoxyPEP ha demostrado ser eficaz para prevenir infecciones sexualmente transmisibles por bacteria como la **clamidia, sífilis y gonorrea.** Consulta con tu médico si es la mejor decisión de tratamiento.

La Doxiciclina es un medicamento que es parte de la familia tetraciclina, utilizado para tratar infecciones causadas por bacterias. No debe tomar doxiciclina si es alérgico a algún antibiótico de tetraciclina.



¿Cuándo debe tomar DoxyPEP?

Se recomienda tomar dos pastillas de 100 mg de doxiciclina dentro de las 24 horas (y no más tarde de 72 horas) después de tener relaciones sexuales orales, anales o vaginales sin condón.

¿Qué pasa cuando vuelve a tener relaciones sexuales sin condón?

Si practica sexo sin condón dentro de las 24 horas luego de haber tomado doxiciclina, puede volver a tomar otra dosis cuando pasen 24 horas después de su última dosis. No tome más de 200 mg (dos píldoras de 100 mg) en un día.



¿Cómo debe tomar la DoxyPEP?



- Tome doxiciclina con mucha agua. Tómela con comida, si siente que le cae mal a su estómago.



- Use protector solar, ya que la sensibilidad de su piel al sol puede aumentar cuando usa antibióticos.



- Evite productos lácteos, calcio, antiácidos o los multivitamínicos mientras use el medicamento.



- Debe tomar su dosis completa; no comparta el medicamento con otras personas.